
Tokaji borvidéki növényvédelmi előrejelzés a május 29. - június 4. közötti időszakra

A változékony időjárás az elmúlt egy hétre is jellemző volt. A csapadékos napokat, napos, kifejezetten meleg és párás napok követték. A hét közepén pedig újra meleg, de csapadékos időre kell számítanunk. Ez a dunsztos időjárás kedvez a kórokozóknak. Az esős idő és a felázott talaj nehezíti a permetezések és kézi munkák elvégzését. A növényvédelmi kezelések előtt mindig tájékozódjunk a várható időjárásról!

Fenológia

Dűlönként, fajtánként és művelésmódonként eltéréseket figyelhetünk meg a szőlő fejlettségében. A virágzás még nem kezdődött meg. 2018-ban május végére már a virágzás végénél tartott a szőlő. A hajtások hossza eltérő, több helyen már a legfelső drótpárt is eléri és a hajtások befűzése is időszerű. Több helyen azonban a hajtásválogatást és a törzstisztítást sem sikerült még elvégezni. Az időben és jó minőségben elvégzett zöldmunka következtében szellősebb a lombzat, gyorsabban száradnak a levelek, illetve a növényvédő szerekkel is hatékonyabb védelmet tudunk elérni.



Furmint T85-ös tőke a Bakonyi dűlőben 2019.05.28-án

Lisztharmat

A meleg, párás időjárási feltételek kedvezőek a kórokozó számára. Jelenleg a legfontosabb teendő a lombzat védelme, meg kell akadályozni a kórokozó lombon való felszaporodását. A megelőző védekezést folytassuk tovább, a kezeléseknél a kontakt kén készítmény mellé társítsunk felszívódó hatóanyagú szert is (pyriofenon, fluxapiraxad, tetrakonazol).

Peronoszpóra

A csapadékos időjárás kedvez a kórokozónak. A következő napokban is számíthatunk csapadékokra és ezáltal több órás levélnedvességre is. A védekezést folytassuk tovább a peronoszpóra ellen. A csapadékos időjárás és az intenzív hajtásnövekedés okán felszívódó hatóanyagot is tartal-


mazó készítményekkel védekezzünk (ciazofamid, metalaxil-M, foszforossav+ditianon), a kombinált készítmények közül azokat válasszuk, amelyekben mankoceb vagy metiram található.

Botritisz

A védekezés egyelőre nem indokolt! Amennyiben a csapadékos, párás időjárás kitart a szőlő virágzásig, akkor erre is fokozott figyelmet kell majd fordítanunk és ennek megfelelően kell majd hatóanyagot választanunk a védekezéshez.

Amerikai szőlőkabóca

Több ültetvényben is észleltük az amerikai szőlőkabóca lárváit. A védekezés egyelőre nem indokolt. Most a legfontosabb teendő a megfigyelés, az ültetvények fertőzöttségének ismerete. Az ültetvények több pontján is végezzünk megfigyelést, mert a kabóca előrefordulása még egy homogén ültetvényben is egyenlőtlen oszlású lehet. A fehérszínű lárvákat az alsóbb levelek fonáki részén keressük. A leveleket óvatosan mozgassuk, mert a lárvák elugorhatnak.



Amerikai szőlőkabóca lárvája a levél fonáki részén 05. 21-én

Tarka szőlőmoly

A kihelyezett csapdák már nem, vagy csak kis számban fogják a tarka szőlőmoly hím egyedeit. Az első nemzedék rajzása a végéhez ért. Az elhúzódó lárvakelés és a nagyobb mértékű fertőzés esetén egyes területeken a második kezelés elvégzése is indokolt lehet. Végezzünk fűrtvizsgálatot, csak indokolt esetben használjuk a rovarölő készítményeket.



Tarka szőlómoly hím egyedek a feromoncsapdában

Atkák

A hajtások alsó, idősebb levelein kismértékű szőlő-gubacsatka károsítás látható. A védekezés azonban a legtöbb ültetvényben nem indokolt.



Szőlő-gubacsatka kártétele

Vadkár

Elsősorban az erdő-közeli ültetvényekben találkozhatunk a vad károsításával. Védekezésre használhatunk állati zsiradékot tartalmazó készítményt, vagy perlit és fakátrány alapú vadriasztó szert, illetve emberi haját helyezhetünk még ki a területre.

Gyomszabályozás

Fordítsunk kellő figyelmet az ültetvények gyomszabályozására is. Kerüljük az ültetvények túlzott elgyomosodását. A gyomok jelentősebb felszaporodása párásabbá teszi az ültetvényt, ami a kórokozóknak kedvezőbb feltételeket teremt. A soraljak gyomirtására a soraljművelő gépeket vagy végső esetben glifozát hatóanyagot használhatunk. Azonban el kell kerülni, hogy a permetlé a szőlő zöld részeire kerüljön! Ezért fontos szerepe van az időben és jól elvégzett törzstisztításnak, ami történhet kézi vagy kémiai úton. Magról kelő gyomnövények ellen, azok néhány leveles állapotában kell védekezni. Élő gyomok ellen a magasabb dózist javasolt alkalmazni a növények intenzív nö-

vekedési fázisában. Apró szulák esetében virágzáskor kell kijuttatni a gyomirtó szert, mezei aszat ellen pedig tölevélrózsás állapotban. A glifozát felhasználása esetén úgy válasszuk meg a permetezés időpontját, hogy a kezelést követő 6 órán belül ne hulljon csapadék, hogy a hatóanyag maradéktalanul fel tudjon szívódni. A sorközök gyomszabályozására legjobb módszer a kaszálás.

A növényvédelmi kezelések elvégzése előtt fontos tájékozódni az időjárási viszonyokról. A várható csapadékról a radarképekről kaphatunk információt (<https://www.idokep.hu/radar>, vagy http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/). Abban az esetben, ha a permetezés közben elered az eső, az utolsó egy órában kezelt területeken célszerű újra elvégezni a növényvédelmi beavatkozást, mivel a kijuttatott permetlének körülbelül egy óra szükséges a megszáradáshoz.

Az elmúlt hét hőmérséklet és csapadék adatai:

2019.05.22-27.	átlaghőmérséklet (°C)	heti csapadék (mm)
Sárospatak Királyhegy	17,32	13,4
Sátoraljaújhely Szemszúró	17,17	23,1
Hercegkút Hosszúhegy	17,62	14
Tolcsva Nyakvágó	16,87	15,4
Erdőbénye Lócse	16,67	24,6
Vámosújfalú Rány	16,6	18,3
Olaszliszka Haraszt	17,45	20,9
Szegi Poklos	17,18	21,1
Tarcal Bakonyi	16,83	11,6
Tokaj Hétszőlő	17,37	15
Bodrogkeresztúr Dereszla	16,8	11,2
Mád Juharos	17,08	22,9
Mád Úrágya	17,05	27,8
Tállya Nyergesek	16,73	16,7
Abaújszántó Kassaváros	16,77	20

Várható időjárás 2019.05.29-06.04.

A csapadékos idő szerdán és csütörtökön tovább folytatódik. Mindkét nap 5 mm-t meghaladó mennyiségre van kilátás. A hét utolsó napjain jelenleg nem várható csapadék. Szerdán és csütörtökön néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, azonban péntek újra melegszik majd az idő. Vasárnap már újra 25°C körüli napi maximumra számíthatunk.